

Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Смекта[®], 3 г, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый, ванильный, клубничный). Соответствует ЛВ от 18.03.2024 (последовательность 0002).

Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Смекта[®], 3 г, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый, ванильный, клубничный).

Препарат Смекта[®] содержит смектит диоктаэдрический. **Показания к применению:** лечение острой диареи у детей старше 2 лет (в дополнение к пероральной регидратации) и у взрослых; симптоматическое лечение хронической функциональной диареи у взрослых; симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника у взрослых. **Способ действия:** смектит диоктаэдрический поглощает бактерии, вирусы и различные токсины, обволакивает стенки кишечника, стабилизирует собственную защитную кишечную слизь и оказывает защищающее действие от раздражителей. **Не применяйте, если у Вас:** аллергия на смектит диоктаэдрический или любые другие вспомогательные вещества.

Беременность и грудное вскармливание: Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. **Рекомендуемая доза:** Для лечения острой диареи рекомендуемая доза для взрослых составляет – 3 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения. Для применения при других показаниях рекомендуемая доза для взрослых составляет – в среднем, 3 пакетика в сутки. Для лечения острой диареи у детей старше 2 лет рекомендуемая доза составляет – 2 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения.

Беременность, грудное вскармливание, фертильность: Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Применение смектита диоктаэдрического не рекомендуется во время беременности и грудного вскармливания, в связи с ограниченными данными. **Возможные нежелательные реакции:** частота неизвестна – гиперчувствительность, ангионевротический отек, зуд; часто – запор.

Хранение: хранить при температуре не выше 30 °С. **Держатель регистрационного удостоверения:** ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА, Франция. **Представитель держателя регистрационного удостоверения на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Армении:** ООО «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23. Тел./факс: +7 (495) 796-87-68; тел.: +7 (916) 764-36-58. **Полная информация содержится в листке-вкладыше лекарственного препарата Смекта[®].**

Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Смекта[®], 3 г, паста для приема внутрь. Соответствует ЛВ от 17.04.2024 (последовательность 0002).

Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Смекта[®], 3 г, паста для приема внутрь. Препарат Смекта[®] содержит смектит диоктаэдрический. **Показания к применению:** лечение острой диареи у детей старше 2 лет (в дополнение к пероральной регидратации) и у взрослых; симптоматическое лечение хронической функциональной диареи у взрослых; симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника у взрослых. **Способ действия:** смектит диоктаэдрический поглощает бактерии, вирусы и различные токсины, обволакивает стенки кишечника, стабилизирует собственную защитную кишечную слизь и оказывает защищающее действие от раздражителей. **Не применяйте, если у Вас:** аллергия на смектит диоктаэдрический или любые другие вспомогательные вещества. **Рекомендуемая доза:** для лечения острой диареи рекомендуемая доза для взрослых составляет – 3 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения. Для применения при других показаниях рекомендуемая доза для взрослых составляет – в среднем, 3 пакетика в сутки. Для лечения острой диареи у детей старше 2 лет рекомендуемая доза составляет – 2 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения. **Беременность, грудное вскармливание, фертильность:** Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Применение смектита диоктаэдрического не рекомендуется во время беременности и грудного вскармливания, в связи с ограниченными данными. **Возможные нежелательные реакции:** частота неизвестна – гиперчувствительность, ангионевротический отек, зуд; часто – запор. **Хранение:** хранить при температуре не выше 25°C. **Держатель регистрационного удостоверения:** ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА САС, Франция. **Представитель держателя регистрационного удостоверения на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Армении:** ООО «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23. Тел./факс: +7 (495) 796-87-68; тел.: +7 (916) 764-36-58. Полная информация содержится в листке-вкладыше лекарственного препарата Смекта[®].